

NEOZIL® 50 EC CONCENTRADO EMULSIONABLE



FUNGICIDA PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA DE FRUTOS CÍTRICOS, MANZANAS Y PERAS


NEOZIL® 50 EC se utiliza para el tratamiento en post-cosecha de las pudriciones y mohos de las frutas, en cítricos, manzanas y peras, controlando un gran número de enfermedades fúngicas, principalmente las causadas por *Penicillium spp.*, *Fusarium spp.*, *Diplodia spp* y *Phomosis*.

El principio activo Imazalil es efectivo contra cepas de hongos resistentes a los fungicidas a base de benzoimidazol.

CONTROLA:

NARANJAS LIMONES POMELOS MANDARINA/CLEMENTINA	Podredumbre verde	<i>Penicillium digitatum</i>
	Podredumbre azul	<i>Penicillium italicum</i>
	Podredumbre negra	<i>Alternaria citri</i>
	Diplodia	<i>Diplodia mutila</i> <i>Diplodia natalensis</i>
	Phomosis	<i>Phomosis citri</i> <i>Diaporthe citri</i>
MANZANAS PERAS	Podredumbre azul	<i>Penicillium expansum</i>
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>
	Antracnosis	<i>Gloeosporium sp.</i>
MELONES	Podredumbres	<i>Fusarium solani</i> <i>Alternaria spp.</i>

Contiene
500 g. de Imazalil /Litro
(50% p/v)



CAS N°: 73790-28-0

NEOZIL® 50 EC ES COMPATIBLE CON CERAS

MODO DE EMPLEO:

NEOZIL® 50 EC se aplica preferentemente en las primeras 24 h., después de la recolección, previamente a la entrada a la cámara de conservación.

Se aplica diluido mediante sistemas de duchas o drencher en la línea de empaque, durante 25-30 segundos. Agitar antes de usar y enjuagar los envases que se vacíen, vertiendo el agua de enjuague en el tanque del drencher. Después del tratamiento, deje secar la fruta antes de su almacenamiento.

Alternativamente se puede aplicar sin diluir sobre la fruta limpia, mediante pulverización o spray en túnel, previamente al encerado, en dosis de 10 cc./Tm. de fruta.

Para la aplicación con ceras, utilizar mezclas al 0,4-0,6% y aplicar mediante spray, vigilando la homogeneidad del gasto del producto, del paso de la fruta y concentración del caldo.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Sistema	Dilución	Dosis/Aplicación
Drencher	100 cc./100 L de Agua	25-30 sg.
Spray	No	10 cc./Tm fruta
Spray con Ceras	800-1.600 cc./200 Kg. cera	En función de dilución

- ✓ NEOZIL® 50 EC ES UN FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO, Y CONTROLA CEPAS RESISTENTES A TIABENDAZOL (TBZ).
- ✓ EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO.
- ✓ NEOZIL® 50 EC ES COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN DE CERAS
- ✓ NEOZIL® 50 EC CONTIENE SURFACTANTES QUE INCREMENTAN SU PENETRACIÓN Y ACTIVIDAD SISTÉMICA.
- ✓ PROLONGADO EFECTO RESIDUAL
- ✓ EL USO DE NEOZIL® 50 EC, APLICADO A LAS DOSIS RECOMENDADAS, NO PROVOCA RESIDUOS SUPERIORES A LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS (LMRs)
- ✓ NO SE REQUIERE PERIDO DE ESPERA ENTRE LA APLICACIÓN Y LA VENTA, O ENTRE LA APLICACIÓN Y EL CULTIVO.

PRESENTACIONES ESTÁNDAR:

Botellas HDPE	1 Litro
Garrafas HDPE	5 Litros
Jerrycans HDPE	25 Litros
Bidones	50 Litros