

NEOZIL® 75 SP




FUNGICIDA SOLUBLE PARA EL TRATAMIENTO POST-COSECHA DE PLÁTANOS, BANANAS Y PIÑAS

NEOZIL® 75 SP es el fungicida de elección para el tratamiento de plátanos y bananas contra el "Crown Rot" y otras pudriciones post-cosecha. Se presenta en forma de polvo completamente soluble en agua.

De amplio espectro de acción, es efectivo contra *Collectotrichum spp.*, *Fusarium spp.*, *Penicillium spp.*, *Verticillium spp.* etc, y es eficaz contra cepas de hongos resistentes a los fungicidas a base de benzoimidazol (tiabendazol)

NEOZIL® 75 SP es también efectivo para el control de las pudriciones post-cosecha de la piña (ananás), causadas principalmente por *Thielaviopsis paradoxa*.

Contiene:
750 g. Imazalil/Kg (75% p/p)
En forma de hidrógeno-sulfato



CAS Nº: 73790-28-0

PATÓGENOS PRINCIPALES QUE CONTROLA:

PLÁTANOS BANANAS	Pudrición de la corona	<i>Fusarium roseum</i> <i>Fusarium semitectrum</i> <i>Collectotrichum sp.</i> <i>Penicillium sp.</i>
	Pudrición del dedo	
	Pudrición del cuello	<i>Verticillium theobromae</i> <i>Ceratocysti C paradoxa</i> <i>Botriodiploclia theobromae</i>
	Antracnosis	<i>Collectotrichum musae</i>
PIÑA (ANANÁS)	Podredumbre del tallo	<i>Thielaviopsis paradoxa</i>
	Podredumbre blanda	

POSEE UNA ACCIÓN TANTO PREVENTIVA COMO CURATIVA

MODO DE EMPLEO:

NEOZIL® 75 SP polvo soluble se aplica diluido en agua tanto para tratamientos por inmersión (baños), ducha (drencher) o mediante pulverización, y puede ser mezclado con alumbre o con otros fungicidas como el tiabendazol. En tratamiento por baño o drencher, se recomienda un tiempo de tratamiento de 25 a 30 segundos, empleando unos 24 Litros de caldo por Tonelada de fruta.

Alternativamente se puede aplicar mediante pulverización o spray en túnel, previamente diluido en agua (100 g./Litro) y a razón de 50 cc. por tonelada de fruta.

En el tratamiento de la piña tropical es aconsejable realizar el tratamiento del pedúnculo durante las 5 primeras horas después del corte, por aplicación de un paño empapado en la solución en la sección de corte.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Sistema	Dilución	Dosis/Aplicación
Inmersión o Drencher	50-60 g. /100 L agua	25-30 sg.
Spray	100 g./ L agua	50 cc. /Tm fruta
Pedúnculo ananás	14 g. / 100 L agua	Paño o absorbente

- ✓ NEOZIL® 75 SP ES UN FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO, Y CONTROLA CEPAS RESISTENTES A TIABENDAZOL (TBZ).
- ✓ EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO.
- ✓ NEOZIL® 75 SP ES COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA, LO QUE FACILITA EL TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA MAQUINARIA.
- ✓ COMPATIBLE CON EL USO DE ALUMBRE Y OTROS FUNGICIDAS.
- ✓ EL USO DE NEOZIL® 75 SP, APLICADO A LAS DOSIS RECOMENDADAS, NO PROVOCA RESIDUOS SUPERIORES A LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS (LMRs)
- ✓ NO SE REQUIERE PERIODO DE ESPERA ENTRE LA APLICACIÓN Y LA VENTA, O ENTRE LA APLICACIÓN Y EL CULTIVO.

PRESENTACIONES ESTÁNDAR:

Bolsitas individuales	16 g. / 25g. / 32 g.	€
Cubos plástico	1 Kg.	€
Bidones	50 Kg.	€



Manufactured by Laboratorios Agrochem S.L.
Tres Rieras, 10 08292 Esparreguera (Barcelona), Spain
Tel. (+34) 93 777 48 53 / Fax. (+34) 93 777 50 59
www.agrochem.es



CONTROLLED QUALITY IN
ALL MANUFACTURED BATCHES